Симптомы:



1) Неожиданные нения направленности ресов в сочетании с лением ранее незнакомых друзей или подруг.

2) Странное поведение риодическая, без видимых причин чрезмерная возбужденность или заторможенность, агрессивность или пассивность).



3) Изменение внешнего облика (неряшливость, непонятный запах от одежды, волос, рук, изорта, затуманенность или блеск глаз, суженные зрачки, слабо реагирующие на изменение освещенность);

4) Появление у подростков различных предметов, ранее не наблюдавшихся (ампулы, упаковки от таблеток, кусочки фольги, закопченные чайные ложки, предметы, которые можно использовать в качестве жгута, кусочки каких-то растений).



5) Возросшая – «лекарственная» заинтересованность подростков (исчезновение некоторых препаратов из аптечки), повышенный интерес к предметам бытовой химии.



Пути решения проблемы.

1) Выясните степень его информированности в отношении губительности потребления наркогенных веществ.

2) Научите подростка противостоять нежелательному влиянию окружающих. Предупредите об опасности общения с людьми, употребляющими наркотики, даже если они кажутся ему очень интересными и симпатичными.

3) Старайтесь быть в курсе дел подростка: где, с кем и как проводит он(а) свободное время. Поощряйте в подростке желание развиваться, поддерживайте его интересы, увлечения.

4) Тестирование обучающихся образовательных учреждений на выявление фактов употребления психоактивных веществ.



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

